



รายการยาระวังการบด แบ่ง หรือเปิด capsule โรงพยาบาลอ่างทอง



รายการยา	ห้าม บด แบ่ง เคี้ยว เปิด cap	ห้าม บด เคี้ยว แต่แบ่ง/เปิดcapsได้	หลีกเลี่ยง บด แบ่ง เคี้ยว	เหตุผล	ทางเลือก
Alendronate+Vitamin D (Fosamax)			✓	ยาทำให้ระคายเคือง GI tract	
Alfuzosin (Xatral)XL 10mg	✓		✓	Modified release	Doxazosin 2mg
Amoxicillin + clavulanate (Augmentin) 375mg และ 1g			✓	ตัวยาคูดความชื้น สลายตัวย่าง การ บดทำให้ยาเหนียว เสื่อมสภาพ	Amoxicillin 200/Clavu 28.5 mg/5 ml dry syrup
Aripiprazole 10mg(Abilify discmelt)			✓	ยาแตกตัวได้ปาก	หากจำเป็นบดยา ละลายในน้ำ และให้ทันที
Aspirin EC 300mg			✓	Enteric coated	Aspirin 81,325mg
Bisacodyl EC 5mg			✓	Enteric coated	Bisacodyl suppo, Senokot, MOM
Bupropion (Quemem) 150mg	✓		✓	Extended release	
Capecitabine 100mg			✓	Cytotoxic drug	หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจำเป็นต้องบด ควรมีอุปกรณ์ ป้องกัน
Cilostazol(pletaal) SR 100mg		✓	✓	Sustained release	
Cyclophosphamide (Endoxan)50mg			✓	Cytotoxic drug	หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจำเป็นต้องบดควรมีอุปกรณ์ ป้องกัน
Diclofenac EC 25mg			✓	Enteric coated	
Doxazosin (Cardura)XL4mg	✓		✓	Extended release	Doxazosin 2mg
Dutasteride (Avodart) 0.5mg			✓ เฉพาะหญิง ตั้งครรภ์	Antiandrogen	หญิงตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจำเป็นต้องบด ควรมีอุปกรณ์ ป้องกัน
Empagliflozin 25mg			✓	ความชื้นทำให้ยาเสื่อมสภาพ	
Enalapril 5mg			✓	ความชื้นทำให้ยาเสื่อมสภาพ	
Erythromycin stearate EC 250mg			✓	ยาทำให้ระคายเคือง GI tract	Erythromycin estorate dry syr 125 mg/5 ml
Finasteride 5mg film coated			✓ เฉพาะหญิง ตั้งครรภ์	Antiandrogen	หญิงตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจำเป็นต้องบด ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน
Isosorbide dinitrate SL 5mg	✓		✓	ไม่ได้ผลการรักษา	สามารถอมใต้ลิ้นได้เลย
Isosorbide mononitrate(Imdur) 60mg		✓	✓	Modified release	Isosorbide dinitrate 10mg
Lansoprazole (Prevacid) FDT15mg			✓	ยาแตกตัวได้เร็วอยู่แล้ว	ละลายในน้ำ 15 ml เขย่าเบาๆ จนยากระจายตัวดี เทใส่ ลงไปใน NG tube แล้ว flush ตามด้วยน้ำ 30 ml
Methotrexate 2.5mg			✓	Cytotoxic drug	หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจำเป็นต้องบดควรป้องกัน
Methylphenidate CR 18mg	✓		✓	Controlled release	Methylphenidate 10mg
Morphine sulfate 20mg (Kapanol)		✓	✓	Sustained release	- เทใส่ในสาย แล้ว Flush ตามด้วยน้ำ หรือผสมน้ำแล้วให้ทันที เพื่อไม่ให้สายอุดตัน หรือ - Morphine immediate release10mg
Morphine sulfate 30mg	✓		✓	Sustained release	Morphine immediate release 10mg
Nifedipine CR 30mg	✓		✓	Controlled release	Nifedipine 5mg หรือยาชนิดอื่น
Omeprazole EC 20 mg		✓	✓	Enteric coated	1.กรณีปลายสายอยู่ที่กระเพาะอาหาร ควรผสมแกรนูลกับน้ำผลไม้รสเปรี้ยว และ flush สายด้วยน้ำผลไม้รสเปรี้ยว ถ้าไม่สามารถใช้น้ำเปล่าได้ 2.กรณีปลายสายอยู่ที่ลำไส้เล็ก ผสมแกรนูลกับน้ำเปล่า หรือบดแกรนูลก่อนผสมน้ำแล้วให้ feed ให้ผู้ป่วย
Phenytoin (Dilantin) SR 100mg	✓		✓	Sustained release	Phenytoin infatab 50mg
Sodium valproate SR200mg		✓	✓	Sustained release	Sodium valproate oral solution 200mg/ml
Sulfasalazine EC 500mg			✓	ยาทำให้ระคายเคืองGI tract	
Tamoxifen citrate 20mg			✓	Cytotoxic drug	หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจำเป็นต้องบดควรป้องกัน
Tamsulosin (Harnal)OCAS 0.4mg	✓		✓	Modified release	Doxazosin 2mg
Theophylline (Duralyn) CR200mg		✓	✓	Controlled release	
Verapamil HCL (Isoptin) SR 240mg		✓	✓	Sustained release	