

## รายการยาที่เก็บในตู้เย็น

อุณหภูมิ 2-8 C <sup>o</sup> (ตู้เย็นช่องปกติ)			
	ยาฉีด		ยาหยอดหู-ตา
1	Addamel <sup>TM</sup> N inj.	1	3% NaCl eye drop
2	Albumin 20% inj.	2	Atropine sulfate 1.0% eye drop
3	Amino acid inj. (Aminoven <sup>®</sup> infant 10%)	3	Chloramphenicol ear drop
4	Anti D immunoglobulin 750 iu /ml 2 ml (Rhesuman <sup>®</sup> , Rhesunativ <sup>®</sup> )	4	Latanoprost eye drop (Xalatan <sup>®</sup> )
5	Antivenom (เซรุ่มงูต่างๆ : งูเห่า, งูเขียวหางไหม้, งูกะปะ, งูแมวเซา ,งูรวมระบบประสาท,งูรวมระบบโลหิต)	5	Phenylephrine eye drop
		6	Tetracaine HCL 0.5% eye drop
6	Augmentin 1.2 g inj.	7	Tobramycin 0.3% eye drop (Tobrex <sup>®</sup> )
7	Bupivacaine 0.5% inj. (Marcaine Heavy <sup>®</sup> ) 0.5%		<b>Vaccines &amp; Immunologicals</b>
8	Calcitonin Salmon inj.	1	BCG vaccine
9	Calcium Folate inj.	2	Diphtheria-Tetanus vaccine (dT)
10	Erythropoietin alpha inj.	3	Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (DTP)
11	Intralipid 20% inj.	4	Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Hepatitis B vaccine (DTP -HB)
12	Methylergometrine inj (Expogin <sup>®</sup> )	5	H1N1 Influenza Vaccine
13	Naloxone hydrochloride inj.	6	Hepatitis B vaccine
14	Octreotide inj 1g/5ml (Sandostatin <sup>®</sup> )	7	Japanese encephalitis vaccine (JE)
15	Oxytocin inj.	8	Measles mumps rubella vaccine (MMR)
16	Prostaglandin E1 inj. (Prostin <sup>®</sup> VR)	9	Tetanus Toxoid inj (TT)
17	Sodium Hyaluronate inj. (IAL-F <sup>®</sup> , Discovic <sup>®</sup> )	10	Rabies vaccine
18	Tuberculin test (ชุดตรวจวัณโรค)	11	Equine rabies immunoglobulin (ERIG)
19	Vitamin C 500 mg/2ml inj.	12	Hepatitis B immunoglobulin (HBIG)
	<b>ยา High alert drug (HAD)</b>	13	Human rabies immunoglobulin (HRIG) (KamRAB <sup>®</sup> )
1	Adrenaline inj. (Epinephrine )	14	Human tetanus immunoglobulin (TIG) (Tetagam <sup>®</sup> P)
2	Amphotericin B inj.	15	Intravenous Immunoglobulin (IVIG)
3	Atracurium besylate 25 mg/2.5 ml inj.(Tracrium <sup>®</sup> )	16	Tetanus Antitoxin inj 1500 iu
4	5-Fluorouracil inj.		<b>ยาเหน็บ</b>
5	Cisatracurium inj.	1	Bisacodyl rectal suppository
6	Heparin inj.	2	Dinoprostone vaginal suppository (Prostin <sup>®</sup> E2)
7	Regular insulin (RI; Actrapid <sup>®</sup> HM)	3	Proctocedyl rectal suppository
8	NPH insulin (Insulatard <sup>®</sup> HM )		<b>Intratracheal administration</b>
9	RI30/NPH70 insulin (Mixtard <sup>®</sup> )	1	Beractant intratracheal suspension (Survanta <sup>®</sup> )
10	Insulin detemir (Levemir <sup>®</sup> )		<b>ยารับประทาน</b>
11	Rocuronium bromide 5 mg/ml inj. (Esmeron <sup>®</sup> )	1	Chloral hydrate syrup
12	Sulprostone 500 µg inj. (Nalador <sup>®</sup> )	2	Lopinavir+Ritonavir suspension
13	Streptokinase inj. (Streptase <sup>®</sup> )	3	Ritonavir 100 mg tablet
14	Succinylcholine inj. (suxamethonium inj.)		
15	Terbutaline sulfate inj.		
อุณหภูมิ ต่ำกว่า -15 C <sup>o</sup> (ตู้เย็นช่องแช่แข็ง)			
1	Oral poliovirus vaccine (OPV)		

## การเก็บรักษาและความคงตัวของยาที่เปิดใช้ได้หลายครั้ง (Multiple dosage form)

ยา	การเก็บรักษาก่อนเปิดใช้	หลังเปิดใช้	
		การเก็บรักษา	ระยะเวลาที่ยาคงตัว
Hepatitis B immunoglobulin (HBIG)	ตู้เย็น (2-8 °C)	ตู้เย็น (2-8 °C)	ดีที่สุดแนะนำให้ใช้ภายใน 24 ชม. เก็บรักษาถูกวิธีและไม่มีการปนเปื้อนเก็บได้นาน 1 เดือน
Calcium folinate injection	ตู้เย็น (2-8 °C)	ตู้เย็น (2-8 °C)	24 ชม.
Heparin injection	<25 °C	20-25 °C	24 ชม.
Insulin	ตู้เย็น (2-8 °C)	ยาที่อยู่ในปากกาเก็บที่อุณหภูมิห้อง (<25 °C)	42 วัน
Ventolin solution	<25 °C	ตู้เย็น (2-8 °C)	30 วัน
Ketamine (Ketalar®)	15-30 °C	ตู้เย็น (2-8 °C)	8 วัน
Lidocaine with adrenaline	ตู้เย็น (2-8 °C)	ตู้เย็น (2-8 °C)	3 วัน
Lidocaine without adrenaline	ตู้เย็น (2-8 °C)	ตู้เย็น (2-8 °C)	3 วัน
Octreotide (Sandostatin)	ตู้เย็น (2-8 °C)	ตู้เย็น (2-8 °C)	24 ชม.
Diphtheria-Tetanus vaccine (dT)	ตู้เย็น (2-8 °C)	ตู้เย็น (2-8 °C)	ดีที่สุดแนะนำให้ใช้ภายใน 24 ชม. สามารถใช้ยาได้จนถึงวันหมดอายุโดยเก็บรักษาถูกวิธีและไม่มีการปนเปื้อน

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2557