

ยาที่ควรหยุดให้ก่อนผ่าตัด

ชื่อยา	ระยะเวลาที่ควรหยุดก่อนผ่าตัด	ระยะเวลาที่ควรเริ่มให้ยาหลังผ่าตัด	ผลต่อผู้ป่วย
Aspirin	7-14 วัน	7 วัน	เลือดออก
Cilostazol (Pletal)	3 วัน	เริ่มได้ทันที	เลือดออก
Clopidogrel (Plavix)	5-7 วัน	1 วัน	เลือดออก
Beraprost (Donor)	4-5 วัน	ไม่มีข้อมูล	เลือดออก
Enoxaparin (Clexane)	12 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	เลือดออก
Fondaparinux (Arixtra)	24 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	เลือดออก
Heparin	4 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง	เลือดออก
Ticlopidine (Ticlid)	10-14 วัน	ไม่มีข้อมูล	เลือดออก
Warfarin			
- INR \leq 1.5	ผ่าตัดได้	ขึ้นกับ INR	เลือดออก
- INR 2.0 - 3.0	5 วัน		
- INR 3.0 - 4.5	6 วัน		
NSAIDs COX-I			
○ Diclofenac	8-12 ชั่วโมง	Start when renal function stable and bleeding risk low	เลือดออก
○ Ibuprofen	1 วัน		
○ Indomethacin	1 วัน		
○ Mefenamic	14-21 ชั่วโมง		
○ Naproxen	3 วัน		
○ Piroxicam	8-12 วัน		
Oral Hypoglycemia			
○ Glibenclamide	หากผู้ป่วยสามารถคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายและเป็นกรผ่าตัดเล็ก (minor surgery) ให้หยุดยามื้อเช้าวันผ่าตัด	เมื่อผู้ป่วยกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติ	Hypoglycemia
○ Glipizide			
○ Gliclazide			
○ Metformin	2 วันก่อนผ่าตัด และหยุดการให้ยาในวันฉีดสี	2-3 วัน เมื่อการทำงานของไตเป็นปกติ	อาจก่อให้เกิด lactic acidosis หรือไตวายเฉียบพลันระหว่างการฉีดสี
HMG-CoA reductase inh.			
○ Simvastatin (Zocor)	1 วัน	เมื่อผู้ป่วยกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติ	Risk of muscle injury
○ Atorvastatin (Lipitor)			
อื่น ๆ			
○ Estrogen (ยาคุมกำเนิด, HRT)	28 วัน	14 วัน	Thromboembolism
○ Glucosamine (Viartil)	14 วัน	7 วัน	Hypoglycemia
○ Tamsulosin (Harnal)	หยุดก่อนผ่าตัดต่อกระฉก	ไม่มีข้อมูล	Intraoperative Floppy Iris Syndrome
○ Vit E, Marine Fatty Acids, Omega-3, Fish oil supplements	14 วัน	7 วัน	Increase risk of bleeding
○ Garlic, Ginkgo	14 วัน	7 วัน	Increase risk of bleeding